



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

Zoonotické virové infekce ve vědě a výzkumu

Vladimír Celer



Zoonotické infekce v minulosti

- Mezidruhový přenos je základním mechanismem jakým se udržuje a rozvíjí druhová pestrost virů v přírodě. Zoonotická infekce není nic jiného než mezidruhový přenos viru mezi člověkem a zvířetem
- Virus musí mít odpovídající receptor a některé faktory virulence umožňující šíření v populaci nového hostitele
- Údajně až 60% virů postihujících člověka má zoonotický původ – nové, zoonotické viry se objevují neustále
- Infekce lidské populace viry divoce žijících nebo domestikovaných zvířat sahá do dávné minulosti
- Endogenní retroviry – zabírají až 10% genomu člověka



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Současnost zoonotických infekcí

Důvody nárůstu počtu zoonotických infekcí

- Máme lepší diagnostické metody
- Měníme planetu
 - Oteplování, geografická distribuce vektorů
 - Zvětšování rozlohy zemědělské půdy- přirozené habitaty divoce žijících zvířat a člověka se překrývají
 - Člověk záměrně proniká do dříve nepřístupných oblastí (bushmeat – protilátky u lovců), konzumace divoce žijících zvířat. – globalizace šíření




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Přenos nejznámějších zoonotických virů



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Národní
plán
obnovy



Vzteklina

Vzteklina – přenos z divoce žijících ale i domácích nakažených zvířat.

Jedna z nejdéle známých zoonóz
Účinná prevence díky vakcinaci,
přesto úmrtí 50.000-70.000 lidí
ročně.

V Evropě tlumena díky orální
vakcinaci rezervoárového
hostitele (liška)

De materia medica, Baghdad, 1224 AD



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU


MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy

Rod *Lyssavirus*


1. *Rabies virus*
2. *Lagos bat*
3. *Mokola*
4. *Duvenhage*
5. *EBLV-1*
6. *EBLV-2*
7. *ABL*
8. - 14 *Aravan*, *Bekeloh bat virus*, *Ikoma*, *Irkut*,
Khujand, *Shimoni bat virus* a *West Caucasian Bat virus*



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 Národní
plán
obnovy



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU


MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy

Virus chřipky

18 typů HA, 12 typů NA, jejich kombinace určuje subtyp viru (H1N1, H5N1....)



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy

Antigenní variabilita

Antigenní drift (posun)


Bodové mutace hemaglutininu viru

Částečně zkřížená imunita

Antigenní shift (zvrat)

Výměna genových segmentů

Kompletní změna antigenní výbavy




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy

Antigenní shift




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 Národní
plán
obnovy

Chřipka



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy

Chřipkové epidemie

1918/19 Španělská chřipka (H1N1)

1957 Asijská chřipka (H2N2)

1968 Hongkongská chřipka (H3N2)

1977 H1N1 Ruská chřipka (Čína)

1997 Pandemická H5N1 (Čína)




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Národní
plán
obnovy

Aviární influenza u člověka?



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy

Epidemie Hepatitis E

Lokalita	Rok	Počet případů
Indie	1955	30000
Myanmar (Barma)	1976	20000
Kašmír	1978	52000
Čína	1986	100000
Somálsko	1988	11000
Mexiko	1989	4000




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy

Geografické rozšíření



(CDC Atlanta)




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy



Balayan M et al. 1983

Fig. 1. Time course of fecal-oral non-A, non-B hepatitis in a human volunteer.

[Vytvořit výřez obrazovky](#)



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy

Hepatitis E

Běžná v zemích s nízkou úrovní hygieny vodních zdrojů

V Evropě a US zpravidla cestovatelská anamnéza

Možný zoonotický přenos z prasete a dalších zvířat



Uganda 2006 © Marie-Noelle Rodrique/MSF
Children gather water at an IDP camp in Patongo



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy

Další hostitelé viru Hep-E

Průkaz viru

Prase domácí

Prase divoké

Jelen

Kůň

Mangusta

Kur domácí

Průkaz protilátek

Primáti

Skot

Malí přežvýkavci

Psi

Kočky

Hlodavci




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy

Hendra virus, Nipah virus



Paramyxoviry koní a prasat se
zoonotickým potenciálem

Rezervoár – pravděpodobně netopýři



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy

Role netopýrů

20% všech savců, druhová pestrost

Dlouhý život – až 40 let

Vysoká koncentrace jedinců – až tisíce v kolonii

Sociální chování – dotýkají se, olizují se,..

Zvláštnosti imunitního systému – slabá reakce na virové infekce, proto viry u nich dlouhodobě perzistují



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní
plán
obnovy